

Fernando Romão nasceu na cidade de Lisboa, em 1973. Atualmente, vive na Guarda com a mulher e o filho, onde gere a sua própria empresa de turismo da natureza, a Wildlife Portugal. A maior parte da sua atividade profissional desenvolve-se no Vale do Côa e na Serra da Estrela, para além disso, colabora com uma editora portuguesa que publica guias turísticos para Portugal.

Fernando Romão desenvolveu, desde muito cedo, o gosto pelo contacto com o mundo natural. Por exemplo, de 1993 a 2002 esteve ligado, de forma voluntária e profissional, à ONG portuguesa Quercus, onde participou e coordenou projetos de conservação e estudo do património natural. Durante este período, começou a interessar-se por fotografar a natureza, interesse este que foi crescendo ao longo dos anos.

As suas fotografias de borboletas levaram a que fosse convidado por Ernestino Maravalhas para participar na produção do guia *As Borboletas de Portugal*. Deste modo, conheceu outras áreas naturais de Portugal e participou em sessões de armadilhagem de borboletas noturnas organizadas por Ernestino Maravalhas e Pedro



Fernando Romão

Pires. Refira-se, ainda, que foi membro fundador da associação *Tagis*, em 2004.

Juntamente com Pedro Pires, Fernando descobriu as borboletas *Thecla betulae* na Serra da Lousã, em 1999, e *Aphantopus hyperantus* perto do Rio Sabor a oeste da freguesia de França, em 2001 (Maravalhas *et al.*, 2004). Presentemente, sabe-se que a *Thecla betulae* tem uma distribuição bastante alargada na metade norte de Portugal (Marabuto *et al.*, 2022), no entanto, a *Aphantopus hyperantus* não tornou a ser encontrada.



*Aphantopus hyperantus* (Linnaeus, 1758)



*Thecla betulae* (Linnaeus, 1758)

Atualmente, embora o Fernando não faça armadilhagem de borboletas noturnas de forma regular, acrescentou duas espécies notáveis à fauna portuguesa, a micro *Stathmopoda pedella* e a *Scotochrosta pulla*, ambas observadas no distrito da Guarda. A primeira tem, até ao momento, um único registo, em Portugal, enquanto que a segunda já foi observada em três outras localidades, todas perto da fronteira com Espanha.

Agradeço ao Fernando o facto de me ter fornecido as informações biográficas que me permitiram redigir este artigo.



*Stathmopoda pedella* (Linnaeus, 1761)  
*Scotochrosta pulla* (Denis & Schiffermüller, 1775)

#### Bibliografia:

Marabuto, E., Pires, P., Romão, F., Lemos, P. & Merckx, T. 2022. A review of the distribution and ecology of the elusive Brown Hairstreak butterfly *Thecla betulae* (Lepidoptera, Lycaenidae) in the Iberian Peninsula. *Nota lepidopterologica* **45**: 101-118.

Maravalhas, E., Pires, P., Garcia-Pereira, P., Romão, F. & Garcia-Barros, E. 2004.

Ampliação do conhecimento dos ropalóceros (Lepidoptera: Hesperioidea e Papilionoidea) do nordeste de Portugal. *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa*, **35**: 137-142.

#### Imagens:

*Aphantopus hyperantus* © Edmundo Jesus; *Thecla betulae* © Agostinho Fernandes; *Stathmopoda pedella* e *Scotochrosta pulla* © Fernando Romão.

Foto de Fernando Romão © Fernando Teixeira.

