









Em 2021, as sessões de armadilhagem realizadas pelas Estações que integram a REBN possibilitaram que se ficasse a conhecer a **nova distribuição de 40 espécies de borboletas noturnas**, em Portugal continental. Assim, o Alto Alentejo acrescentou 2 espécies à sua lista de Lepidoptera, o Algarve 6, a Beira Baixa 3, a Beira Litoral 9, o Douro Litoral 4, a Estremadura 7, o Minho 4 e o Ribatejo 10.

<p>Ribatejo</p>	<p><i>Phylodesma suberifolia</i> (Duponchel, 1842) <i>Idaea mustelata</i> (Gumpfenberg, 1892) <i>Idaea infirmaria</i> (Rambur, 1833) <i>Cyclophora porata</i> (Linnaeus, 1767) <i>Catarhoe basochesiata</i> (Duponchel, 1831) <i>Epirrhoe alternata</i> (Müller, 1764) <i>Eupithecia pantellata</i> Millière, 1875 <i>Abraxas pantaria</i> (Linnaeus, 1767) <i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758) <i>Mythimna languida</i> (Walker, 1858)</p>	 <p><i>Orthosia gothica</i> Ribatejo</p>  <p><i>Nola confusalis</i> Minho</p>
<p>Minho</p>	<p><i>Scopula minorata</i> (Boisduval, 1833) <i>Cucullia calendulae</i> Treitschke, 1835 <i>Lithophane semibrunnea</i> (Haworth, 1809) <i>Nola confusalis</i> (Herrich-Schäffer, 1847)</p>	 <p><i>Caradrina proxima</i> Estremadura</p>
<p>Estremadura</p>	<p><i>Ennomos alniaria</i> (Linnaeus, 1758) <i>Thalera fimbrialis</i> (Scopoli, 1763) <i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758) <i>Caradrina proxima</i> Rambur, 1837 <i>Agrochola blidaensis</i> (Stertz, 1915) <i>Agrochola haematidea</i> (Duponchel, 1827) <i>Mythimna languida</i> (Walker, 1858)</p>	 <p><i>Agrochola haematidea</i> Douro Litoral e Estremadura</p>
<p>Douro Litoral</p>	<p><i>Acasis viretata</i> (Hübner, 1799) <i>Raphia hybris</i> (Hübner, 1813) <i>Coenobia rufa</i> (Haworth, 1809) <i>Agrochola haematidea</i> (Duponchel, 1827)</p>	 <p><i>Luperina dumerilii</i> Beira Litoral</p>
<p>Beira Litoral</p>	<p><i>Triodia sylvina</i> (Linnaeus, 1761) <i>Nebula ibericata</i> (Staudinger, 1871) <i>Chesias rufata</i> (Fabricius, 1775) <i>Coscinia chrysocephala</i> (Hübner, 1804) <i>Eilema marcida</i> (Mann, 1859) <i>Cucullia calendulae</i> Treitschke, 1835 <i>Luperina dumerilii</i> (Duponchel, 1826) <i>Hadena bicruris</i> (Hufnagel, 1766) <i>Agrotis lata</i> Treitschke, 1835</p>	 <p><i>Idaea sardonata</i> Beira Baixa</p>
<p>Beira Baixa</p>	<p><i>Idaea sardonata</i> (Homberg, 1912) <i>Coscinia chrysocephala</i> (Hübner, 1804) <i>Tathorhynchus exsiccata</i> (Lederer, 1855)</p>	 <p><i>Griposia aprilina</i> Algarve</p>
<p>Algarve</p>	<p><i>Idaea fuscovenosa</i> (Goeze, 1781) <i>Idaea rhodogrammaria</i> (Püngeler, 1913) <i>Perizoma flavofasciata</i> (Thunberg, 1792) <i>Lenisa geminipuncta</i> (Haworth, 1809) <i>Lithophane ornitopus</i> (Hufnagel, 1766) <i>Griposia aprilina</i> (Linnaeus, 1758)</p>	 <p><i>Coscinia chrysocephala</i> Alto Alentejo e Beira Baixa</p>
<p>Alto Alentejo</p>	<p><i>Coscinia chrysocephala</i> (Hübner, 1804) <i>Clytie illunaris</i> (Hübner, 1813)</p>	